



ご使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう保管してください。

第②類医薬品

せきに、たん

鎮咳去痰薬

ペリコン

咳止め錠

生薬配合 糖衣錠

「せき」は発熱とともに呼吸器系疾患の代表的な症状で、非常に苦痛をともなうものです。

この症状が長引くとのどを傷め、声がかれ、さらには心臓や肺に負担がかかり、体力が消耗して余病を併発することがあります。こじらせないよう早めの対処が必要です。

ペリコンは、配合成分の生薬と洋薬の相乗作用により、のどが痛く「たん」をともなう「せき」や、アレルギー性の呼吸困難や「せき」にも素早い効きめをあらわします。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと

12歳未満の小児。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等
(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと

(眠気等があらわれることがある)

4. 授乳中の人は本剤を使用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

5. 過量服用・長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。 高熱、排尿困難
- (6) 次の診断を受けた人。

心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、てんかん、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
循 環 器	動悸
泌 尿 器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白く見える、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

便秘、口のかかわき、眠気

4.5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】 せき、たん

【用法・用量】 次の量を、食後に服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	4錠	3回
12歳以上 15歳未満	2錠	
12歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- 1.用法、用量を厳守すること。
- 2.小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

【成分・分量】 成人1日量（12錠）中

はたらき	成 分	分量(12錠中)
せきをしずめます。	ジヒドロコデインリン酸塩 <i>dl</i> -メチルエフェドリン塩酸塩 ジプロフィリン	24mg 50mg 100mg
アレルギー性のせきをしずめます。	クロルフェニラミンマレイン酸塩	8mg
抗ヒスタミン剤による眠気をおさえます。	無水カフェイン	90mg
のどの痛み、せきをしずめます。	カンゾウ末（甘草）	500mg
たんを出しやすくします。	キキョウ末（桔梗） セキサンエキス（石蒜）	500mg 25mg

添加物：ケイ酸Al、セルロース、パレिशヨデンプン、タルク、ポビドン、セラック、ポリビニルアセタールジエチルアミノアセテート、炭酸Ca、白糖、ゼラチン、カルナウバロウ、酸化チタン

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。
(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 本剤をぬれた手で扱わないこと。
(ぬれた手で扱うと、糖衣にムラができたり、変色したりすることがある)
- (5) ビン内の詰め物は、輸送中の錠剤の破損防止用なので、開封後は捨てること。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。また開封後は使用期限内であってもなるべく速やかに服用すること。

このお薬についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記へお願い致します。

奥田製薬株式会社 お客様相談窓口

☎06-6351-2100(代表) 受付時間 9:00～17:00(土日祝日を除く)

発売元



奥田製薬株式会社

大阪市北区天満1丁目4番5号

製造販売元

中外医薬生産株式会社

三重県伊賀市ゆめが丘7-5-5