

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第②類医薬品

水虫・たむし治療薬 ルミアTR液

特長

テルビナフィン塩酸塩が角質層の奥深くにまで浸透し、1日1回の塗布で水虫・たむしに効果を発揮します。
ジフェンヒドラミン塩酸塩、リドカイン、クロタミトンが患部のかゆみを鎮めます。
イソプロピルメチルフェノールがニオイの元となる雑菌の繁殖を抑えます。
グリチルレチン酸が患部の炎症を抑えます。
ℓ-メントールが清涼感を与えます。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください。
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の部位には使用しないでください。
(1) 目や目の周囲、粘膜 (例えば、口腔、鼻腔、膈等)、陰のう、外陰部等。
(2) 湿疹。
(3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。

🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 乳幼児。
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5) 患部が顔面又は広範囲の人。
(6) 患部が化膿している人。
(7) 「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。
(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。)
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	かぶれ、刺激感、熱感、鱗屑・落屑 (フケ、アカのような皮膚のはがれ)、ただれ、乾燥・つっぱり感、皮膚の亀裂、痛み、色素沈着、発疹・発赤*、かゆみ*、はれ*、じんましん*

*：全身に発現することもあります。

3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合や、本剤の使用により症状が悪化した場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

(必ず裏面もお読みください)

【効能・効果】

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

【用法・用量】

1日1回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (4)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5)外用にのみ使用してください。
- (6)本剤のついた手で、目や粘膜にふれないでください。

〔プッシュ式液体容器の使用方法〕

・容器を下向きにして、先端を患部に軽く押し当てて塗布してください。

【成分・分量】（100g中）

テルピナフィン塩酸塩	1.0g	ジフェンヒドラミン塩酸塩	1.0g
リドカイン	2.0g	グリチルレチン酸	0.5g
クロタミトン	5.0g	イソプロピルメチルフェノール	1.0g
ℓ-メントール	2.0g		

添加物として、エタノール、マクロゴール、pH調節剤、香料を含有します。

〈成分に関連する注意〉

アルコールを含んでいますので、塗布時にしみることがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。）
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。
- (5)火気に近づけないでください。また、使用済み容器は火中に投じないでください。
- (6)アルコール類、油脂類等で変質・変色のおそれのあるもの（化学繊維、合成樹脂、家具、床等）への付着は避けてください。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

（独）医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話:0120-149-931（フリーダイヤル）

このお薬についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記へお願いいたします。

奥田製薬株式会社 お客様相談窓口

☎ 06-6351-2100（代表）受付時間 9：00～17：00（土日祝日を除く）

発 売 元

製造販売元



奥田製薬株式会社

新生薬品株式会社

富山県中新川郡上市町横越16番1

大阪市北区天満1丁目4番5号

<https://www.okudaseiyaku.co.jp/>

SNO