



服用の前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう保管してください。

第3類医薬品

小粒でのみやすい ビタミンCオクダ

ビタミンC主薬製剤

ビタミンCには、風邪やストレスなどに対する抵抗力を強めたり、肌の張りを保つコラーゲンの合成をしたり、しみやくすみの原因となるメラニンの生成を防ぐ働きなどが知られています。

ビタミンCオクダは、ビタミンC(アスコルビン酸・アスコルビン酸ナトリウム)にビタミンB₂を配合したのみやすい錠剤です。

しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着の緩和や、肉体疲労、妊娠・授乳期、病中病後のビタミンC補給などにどうぞ



使用上の注意

相談すること



- 1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐

- 2.服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

下痢

- 3.1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着

次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻出血

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください。」

次の場合のビタミンCの補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

【用法・用量】

次の量を食後に服用してください。

年 令	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	1~3錠	2回
11才以上15才未満	1~2錠	
7才以上11才未満	1錠	
7才未満	服用しないこと	

【用法・用量に関連する注意】

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 定められた用法・用量を守ってください。

【成分・分量】成人1日最大服用量(6錠)中

アスコルビン酸(ビタミンC)として 2000mg

(アスコルビン酸(ビタミンC) 1000mg
L-アスコルビン酸ナトリウム 1124.79mg
(ビタミンCとして1000mg))

リボフラビン酪酸エステル(ビタミンB₂酪酸エステル) 6mg

添加物としてトウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウム、ヒドロキシプロピルセルロース、結晶セルロース、クロスボドン、軽質無水ケイ酸を含有します。

【成分に関連する注意】

本剤の服用により、尿及び大便の検査値に影響を与えることがあります。医師の治療を受ける場合は、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師に知らせてください。ビタミンB₂の一部が尿中に排泄されるため、尿が黄色くなることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり、品質が変わるのを防ぐため。)
- 湿気により、錠剤表面の色が部分的に変わるがありますが、効能・効果に変わりはありません。品質保持の点からぬれた手で触れないでください。
- ビンの中の詰め物は、錠剤の破損を防止するために入れてありますので、開栓後は捨ててください。
- 乾燥剤は、最後まで捨てずに使用してください。
- 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

このお薬についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記へお願いいたします。

奥田製薬株式会社 お客様相談窓口

☎ (06) 6351-2100(代表) (午前9時から午後5時まで、土日祝日を除く)



奥田製薬株式会社

大阪市北区天満1丁目4番5号

<http://www.okudaseiyaku.co.jp>